



Acetaminophen (Tylenol) Instrucciones de Administracion
Cada 4 horas si necesita para el dolor o calentura mas que 100.4⁰ F (38⁰ C)
 * No le dé más de 5 veces en un período de 24 horas*

La dosis adecuada para su niño/a se basa en su peso. Encuentra peso de su niño en la columna de peso del lado izquierdo. A continuación, encontrar qué producto (forma y fuerza / concentración) que tiene en los que aparecen en la fila superior. A continuación, encontrará dosis de su niño en esa columna.
 mg = milligramas, ml = mililitros

| Peso (libras) | Infantiles/Ninos (jeringuilla) 160mg/5ml | Tabletas 80mg | Tabletas 160mg | Supositorio 80mg, 120mg, y 325mg | Peso (kilogramas) |
|---------------|--|---------------|----------------|----------------------------------|-------------------|
| 6-7 | 1ml | | | | 3 |
| 8-9 | 1.5ml | | | ½ de 120mg | 4 |
| 10-11 | 2ml | 1 tab | ½ tab | 1 de 80mg | 5 |
| 12-13 | 2.5ml | 1 tab | ½ tab | 1 de 80mg | 6 |
| 14-16 | 3ml | 1 tab | ½ tab | 1 de 80mg | 7 |
| 17-18 | 3.5ml | 1 y ½ tabs | ½ tab | 1 de 120mg | 8 |
| 19-22 | 4ml | 1 y ½ tabs | ½ tab | 1 de 120mg | 9 |
| 23-24 | 4.5ml | 2 tabs | 1 tab | 1 de 120mg | 10 |
| 25-26 | 5.5ml | 2 tabs | 1 tab | ½ de 325mg | 11-12 |
| 27-31 | 6ml | 2 y ½ tabs | 1 tab | ½ de 325mg | 13-14 |
| 32-35 | 7ml | 3 tabs | 1 y ½ tabs | 2 de 120mg | 15-16 |
| 36-39 | 8ml | 3 tabs | 1 y ½ tabs | 2 de 120mg | 17-18 |
| 40-44 | 9ml | 3 y ½ tabs | 1 y ½ tabs | 2 de 120mg | 19-20 |
| 45-48 | 10ml | 4 tabs | 2 tabs | 1 de 325mg | 21-22 |
| 49-53 | 11ml | 4 tabs | 2 tabs | 1 de 325mg | 23-24 |
| 54-57 | 12ml | 4 y ½ tabs | 2 tabs | 1 de 325mg | 25-26 |
| 58-62 | 13ml | 5 tabs | 2 y ½ tabs | 1 de 325mg | 27-28 |
| 63-66 | 14ml | 5 y ½ tabs | 2 y ½ tabs | 1 de 325mg | 29-30 |
| 67-71 | 15ml | 6 tabs | 3 tabs | 1 y ½ de 325mg | 31-32 |
| 72-75 | 16ml | 6 tabs | 3 tabs | 1 y ½ de 325mg | 33-34 |
| 76-80 | 17ml | 6 y ½ tabs | 3 tabs | 1 y ½ de 325mg | 35-36 |

*Al utilizar el acetaminophen/paracetamol y el ibuprofen/ibuprofeno productos al mismo tiempo, es posible alternar cada 3 horas.
 *Esto no es para los lactantes menores de 3 meses o niños con problemas en el hígado antes de consultar primero con un médico.
 *Para niños de más de 80 libras (36 kg) por favor refiérase a las instrucciones que figuran en el lado del producto.
 *Llame a la oficina si tiene preguntas o problemas.